





Carcinoma microquístico anexial

- Descrito por Goldstein, Barr, Santa Cruz 1982
- Sinónimos: siringoma maligno, carcinoma ductal sudoríparo esclerosante, carcinoma de glándula sudorípara con características siringomatosas, tricofoliculoma agresivo.
- Localmente agresivo por expansión e infiltración.
- Gran morbilidad y recurrencia.

Carcinoma microquístico anexial

- Cabeza/cuello
 - extrafacial: piel cabelluda, axila, cuello,
- tórax, nalgas, genital, perianal – algunas series lado izquierdo
- Metástasis excepcionalmente raro (ganglio linfático)
- Asociación radioterapia (acné)
- – inmunosupresión

Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1996;122
Am J Dermatopathol 2000;22
J Cutan Pathol 1999;26



Carcinoma microquístico anexial

- **Inmunohistoquímica**
- unidad folículo/sebácea/apocrina ó ecrino
- CEA, EMA
- AE1/AE3
- CK7 excepto periferia
- p53 no significativo (positivo favorece al carcinoma basocelular)
- no presenta células de Merkel, diferente a tricoepitelioma desmoplásico

Am J Surg Pathol 2001;25
Arch Dermatol 1986;122
Arch Dermatol 1990;126

Carcinoma microquístico anexial



- Recurrencias disminuyen con cirugía de Mohs
- CMA excepcional involucro de ganglios linfáticos, pulmón y menor diseminación sistémica



Carcinoma microquístico anexial

Diagnóstico diferencial

- Tricoepitelioma desmoplásico
- Tricoadenoma
- Carcinoma ductal ecrino
- Siringoma



Tricoepitelioma desmoplásico

- Placa de crecimiento lento blanca o amarillenta de 3-8mm de diámetro
- Usualmente asintomática y raro que ulcere
- Cara
- Depresión central
- Recurrencia



